

อัตราการใช้ : แอนติรา

วัตถุประสงค์	อัตราการใช้	วิธีการใช้
บำรุงดิน สร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโรค	ใช้ แอนติรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่นทุกๆ 10 -15 วัน
กรณีพบโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อ <i>Phytophthora sp.</i>	ใช้แอนติรา 40-50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ แอนติรา 1 ส่วน ต่อน้ำ 1ส่วน	ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วัน ฉีดพ่นเข้าลำต้น
กรณีพบโรคผลเน่า เชื้อ <i>Phytophthora sp.</i>	ใช้ แอนติรา 40-50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วัน
กรณีพบโรคดอกเน่า แอนแทรคโนส เชื้อ <i>Colletotrichum sp.</i>	ใช้ แอนติรา 40-50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่น ทุกๆ 7 -10 วัน
กรณีพบโรคใบติด เชื้อ <i>Rhizoctomia solani</i>	ใช้ แอนติรา 50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วัน
กรณีพบโรคราสีชมพู เชื้อ <i>Corticium</i>	ใช้ แอนติรา 50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วัน
กรณีพบโรคเหี่ยว เชื้อ <i>Fusarium sp.</i>	ใช้ แอนติรา 40-50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่น ทุกๆ 7 -10 วัน
กรณีพบจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น แคลงเกอร์ ใบส้มในข้าว	ใช้ แอนติรา 40-50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่น ทุกๆ 7 -10 วัน

คำแนะนำ เอ็นพี แอนติรา สามารถใช้กับเกษตรกรอินทรีย์
สำหรับการบำรุงรักษาและป้องกันโรคพืช ควรใช้สม่ำเสมอ